

CAROLI a LINNÉ,
Equitis Aur. de Stella Polari,
ARCHIATRI REGII, MED. & BOTAN. PROFESS. UPSAL.,
ACAD. PARIS. UPSAL. HOLMENS. PETROPOL.
BEROL. IMPER. LOND. ANGL. MONSPEL.
TOLOS. FLORENT. EDINB. BERN. Soc.

SYSTEMA NATURÆ

PER
REGNA TRIA NATURÆ,
SECUNDUM
CLASSES, ORDINES,
GENERA, SPECIES,
CUM
*CHARACTERIBUS, DIFFERENTIIS,
SYNONYMIS, LOCIS.*

TOMUS I.

12 EDITIO DUODECIMA, REFORMATA.
Cum Privilegio S:æ R:æ M:is Svecia.

HOLMIAE,
IMPENSIS DIRECT. LAURENTII SALVII,
1766.

Babyrus- 5. S. dentibus duobus caninis fronti innatis.
 sa. Babyrousa. Bon. jav. 61. Barthol. cent. 2. obs. 96.
 Grew. mus. t. 1. Seb. mus. 1. p. 80. t. 50. f. 2. Raj.
 quadr. 96.

Habitat in Borneo Indiæ orientalis.

Magnitudine Cervi. Dentes Lantarii superiores II,
 perforantes cranium fronti, recurvati ut 2 cornua;
 inferiores utrinque solitarii, magni, adstant priori-
 bus, minus recurvi. Primumores superiores 4; inferio-
 res 6. Molares 5.

36. RHINOCEROS. *Dentes primores utrinque II,*
remotissimi, obtusi.
Cornu solidum, conicum, na-
so insidens.

unicor- 1. RHINOCEROS. Gesn. quadr. 842. Aldr. bisulc. 878.
 nis. Jonst. quadr. 98. t. 38. Bon. jav. 50. t. 51. Ber-
 gen. orat. 1746. t. 1. Raj. quadr. 122. Edw. av.
 t. 221. f. 2.

bicornis. β. R. cornibus duobus. Syst. nat. 10. p. 56. n. 2.
Habitat in Africa, India, vicitans vepretibus, spinis,
in cœno se volutans, mitis nisi lacefetur, irritatus
cum fragore arbores prosternit, lambendo trucidat.
Quantus erat cornu cui pila Taurus erat. Martialis.

Statura & magnitudo Elephantis, sed pedibus brevio-
 ribus. Cutis nuda pilis, nisi cauda & auriculis,
 Suturæ s. Rugæ transversales: α. Capitis postica;
 β. Scapularis; γ. Abdominalis ante femora; δ. Fe-
 moralis trans femora. Ungulæ tres. Cauda atte-
 nuata, pedibus brevior.