

CAROLIA LINNÆ,

EQUITIS AUR. DE STELLA POLARI.

ARCHIATRI REGII, MED. ET BOTAN. PROFESS. UPSAL., ACAD. PARIS,  
UPSAL. HOLMENS. PETROPOL. BEROL. IMPER. LOND. ANGL.  
MONSPEL. TOLOS. FLORENT. EDINB. BERN. SOC.

S Y S T E M A  
N A T U R Æ,

P E R

REGNA TRIA NATURÆ,

SECUNDUM

CLASSES, ORDINES, GENERA,  
SPECIES

CUM

CHARACTERIBUS, DIFFERENTIIS,  
SYNONYMIS, LOCIS.

T O M U S I

*Editio decima tertia,  
ad Editionem duodecimam reformatam Holmiiensem.*

VINDOBONAE,

TYPIS IOANNIS THOMAE NOB. DE TRATTNERN,  
CARB. REG. AULAE TYPOGR. ET BIBLIOPOLAR.

M D C C L X V I I .

10,536

- Babyrus- 5. S. dentibus duobus caninis fronti innatis.  
 sa. Babyroussa. *Bont. jav. 61. Barthol. cent. 2. obs. 96.*  
*Grew. mus. t. 1. Seb. mus. 1 p. 80. t. 50. f. 2. Raj.*  
*quadr. 96.*  
*Habitat in Borneo Indiæ orientalis.*  
 Magnitudine Cervi. Dentes Lanarii superiores II,  
 perforantes cranium frontis, recurvati, ut 2 cornua;  
 inferiores utrinque solitarii, magni, adstant priori-  
 bus, minus recurvi. Primores superiores 4; inferior-  
 res 6. Molares 5.

36. RHINOCEROS. Dentes Primores utrinque II,  
 remotissimi, obtusi.  
 Cornu solidum, conicum, na-  
 so infidens.

- unicor- I. RHINOCEROS. *Gesn. quadr. 842. Aldr. bisul. 878.*  
 nis. *Jonst. quadr. 98. t. 38. Bont. jav. 50. 51. Bergen.*  
*orat. 1746. t. 1. Raj. quadr. 122. Edw. av. t. 221.*  
*f. 2.*  
 bicornis. β. R. cornibus duobus. *Syst. nat. 10. p. 56. n. 2.*  
*Habitat in Africa, India victians, vepretibus, spinis,*  
*in cæno se volutans, mitis nisi laceffetur, irritatus*  
*cum fragore aibores proferunt, lambendo trucidat.*  
*Quantus erat cornu cui pila Taurus erat. Martialis.*  
 Statura & magnitudo Elephantis, sed pedibus breviori-  
 bus. Cutis nuda pilis, nisi cauda & auriculis, Su-  
 turæ s. Rugæ transversales: α. Capitis postica; β. Sca-  
 pularis; γ. Abdominalis ante femora; δ. Femoralis  
 trans femora; Ungulæ tres. Cauda attenuata, pe-  
 dibus brevior.

## VII. CETE.

*Spiracula supra Caput.*  
*Pinnae Pectorales caudalisque horizontalis*  
*absque unguibus.*

37. MONODON. Dentes duo in maxilla superiore  
 exserti, prælongi, recti, spi-  
 rales.  
 Fistula in vertice.

- Mono- I. MONODON. *Art. gen. 78. syn. 108. Fn. sue: 48.*  
 ceros. *Monoceros piscis. Will. icht. 42. Raj. pisc. 11.*  
*Unicornu marinum. Tulp. obs. 375. Worm. mus.*  
*283. t. 284.*  
*Habitat in Oceano septentrionali Americæ, Europæ.*  
*Cornu Monocerotis spirale hujus Dens est: dentes tales*  
*2 in junioribus, labium superius perforantes, Pinnae*  
*2: dorsalis nulla.*

38. BALÆNA. Dentium loco in maxilla superiore  
 laminae corneæ.  
 Fistula duplex.

- Mystice- I. B. naribus flexuosis in medio capite, dorso impinni.  
 tus. *Art. gen. 76. syn. 106. Faun. suec. 49. Mus. Ad.*  
*Fr. 1. p. 51.*  
*Balæna dorso impinni, fistula in medio capite, dorso*  
*caudam versus carinato. Gron. zooph. 139.*  
*Balæna bipinnis, dorso lævi nigricante, ventre albo.*  
*Briss. cet. 347.*  
*Balæna. Will. icht. 35.*  
*Balæna vulgo s. Musculus. Rond. pisc. 475.*  
*Balæna vulgo s. Mysticetus aristotelis. Gesn. pisc. 114.*  
*Balæna vulgaris edentula, dorso non pinnato. Raj.*  
*pisc. 6.*