

REGNUM ANIMALE

IN CLASSES IX DISTRIBUTUM;

S I V E

SYNOPSIS METHODICA

SISTENS GENERALEM *ANIMALIUM*

distributionem in Classes IX, & duarum primarum
Classium, *Quadrupedum*, scilicet & *Cetaceorum*, parti-
culare in divisionem in Ordines, Sectiones, Genera &
Species.

CUM BREVI CUJUSQUE SPECIEI

. descriptione, Citationibus Auctorum de iis tractantium,
Nominibus eis ab ipsis & Nationibus impositis, Nominibus-
que vulgaribus.

A. D. BRISSON, Historiae Naturalis Musci Realmuriani
Demonstratore.

Cum Figuris &cneis.



P A R I S I S,

AD RIPAM AUGUSTINORUM.

Apud CL. JOANNEM-BAPTISTAM BAUCHE, Bibliopolam, ad
Insigne Ste. Genovefæ, & Ste. Joannis in Deserto.

M. DCC. LVI.

Cum Privilegio Regis & Approbatione.



ORDO VIII.

QUADRUPEDA

Dentibus incisoribus in utrâque maxillâ, & tribus digitis ungulatis in singulis pedibus donata.

RHINOCEROS solus hunc Ordinem constituit.

XVI.

Genus Rhinocerotis:

Hujus character est

Dentes incisores in utrâque maxillâ duo, à se invicem plurimum remoti:

In singulis pedibus digititres ungulati:

Cornu in naso.

Obs. Uniusquisque maxilla pars anterior aliquo modo plana est, vel potius quasi quadratum truncata; & unusquisque dens incisorius in angulis, partibus maxillarum anterioribus & lateralibus constitutis, situs est. Dentes caninos non habet; sed 12 sunt molares in utrâque maxillâ, 6 utrinque.

ORDRE VIII.

LES QUADRUEDES

Qui ont des dents incisives aux deux mâchoires, & trois doigts ongulés à chaque pied.

IL n'y a dans cet Ordre qu'un seul QUADRUEDE, qui est le Rhinoceros.

XVII.

Le Genre du Rhinoceros:

Son caractere est . . .

D'avoir à chaque mâchoire deux dents incisives, très éloignées l'une de l'autre :

Trois doigts ongulés à chaque pied :

Une corne sur le nez.

Obs. La partie antérieure de chacune de ses mâchoires est en quelque façon aplatie, ou plutôt comme coupée quarrément, & chacune des dents incisives est placée à peu-près dans un des angles formés par le devant des mâchoires & leurs côtés. Il n'a point de dents canines; mais il a à chaque mâchoire 12 dents molaires, 6 de chaque côté.

** I. LES RHINOCEROS.

RHINOCEROS.

Rhinoceros cornu unico conico. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 25. sp. 3.*

Rhinoceros. *Raj. Syn. Quadr. p. 122.*

Klin. Quadr. p. 26.

Gesn. Quadr. p. 952. Fig. p. 953. (Fig. mala).

Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 60. [Fig. mala].

Aldro. Quadr. Bis. p. 878. Fig. p. 884. [Fig. mala].

Jonst. Quadr. p. 66. Fig. T. 38. (Fig. mala).

Mus. Worm. p. 336.

Charlet. Exer. p. 12.

Abada, sive Rhinoceros. *Bont. Ind. Ori. p. 50. Fig. p. 51. [Fig. sat bona, si digitii ungulati effent].*

Naricornis Catelani. *Klein.*

Rhinoceros. *Kolbe. Tom. III. p. 13. Fig. p. 14. (Fig. mauvaise).*

Porte-Corne. *Klein.*

Les Hébreux l'appellent REEM. *Gesn.*

Les Chaldéens, KARAS, ou KARASCH. *Gesn.*

Les Grecs, Ρίνος.

Les Perses, ELKERKEDOM. *Klein.*

Les Italiens, RHINOCEROTE. *Klein.*

Les Polonois, NOZOROZEC; ZEBATI. *Klein.*

Les Suédois, ENHÖRNING. *Linn.*

Les Habitans du Cap de B. Esp. TUABBA; NABBA. *Klein.*

Les Indiens, SANDA BENAMET. *Gesn. GOMELA. Klein.*

Les Habitans de Java, ABADA; NOEMBA. *Klein.*

Il a, depuis la partie supérieure du dos jusqu'à terre, environ 6 pieds ; depuis le bout du museau jusqu'à la queue, environ 12 pieds : le tour de son corps est égal à sa longueur. Sa tête est oblongue ; ses yeux petits ; ses oreilles semblables à celles d'un Cochon : sa lèvre supérieure, qu'il peut étendre & retirer à volonté, est beaucoup plus longue que l'inférieure, & pointue. Il porte une corne sur le nez ; (Quelques Au-

A parte superiore dorsi ad terram usque, 6 pedes circiter altus est ; ab extremitate oris ad caudam, 12 pedes circiter longus : ambitus corporis longitudini equalis. Caput habet oblongum ; oculos parvos ; auriculas porcinis similes ; labium superius, quod extendere & contrahere potest, inferiore multò longius, & valde acutum ; in naso cornu unum, (quandoque duo, secundūm Authores quo-

LES QUADRUPEDES, Classe I. Ordre VII. 115
dam) ; caudam 2 pedes longam. Cutis ex cinereo nigreficit, estque admodum rugosa, cum profundis plicaturis in collo, dorso, lateribus & cruribus. Pilos non habet, nisi in caudâ, & auriculis. Habitat in Africæ desertis, in que regnis Bengala, & Patanæ Afia.

teurs prétendent qu'il en a quelquesfois deux). Sa queue est longue de 2 pieds. Sa peau est d'un gris presque noir, très raboteuse, avec des plis considérables au col, sur le dos, aux côtés, & aux jambes. Il n'a des poils qu'aux oreilles, & à la queue. On le trouve dans les déserts de l'Afrique, & dans les Royaumes de Bengale, & de Patane en Asie.

