

Dr. H.D. TJEENK WILLINK

Mammalia voorkomende in Nederlandsch-Indië.

Natuurkundig Tijdschrift van Nederlandsch-Indië, deel LXV (tiende serie, deel IX). 1905
pp. 153-345

[201]

Rhinocerotidae

55. Rhinoceros sumatrensis Cuv.

Inl.namen: Soemboe-Badak (Pane- en Bila-gebied, Sum.); badak (Mal., Soend); Warak (Jav.).

Verspr.: Sumatra, Borneo.

Maten: Lengte tot aan den wortel van de staart 248 cm; hoogte 135 cm; lengte van den kop 70 cm; lengte van den staart 32 cm.

De neushoorn komt zoowel in de vlakke als in het ontoegankelijke gebergte voor. De huid is ruw en korrelig; de kleur is bruinachtig graauw; de horens zijn bruin of zwart.

56. Rhinoceros sondaicus Desmarest

Inl.Namen: badak (Mal.Soend.); warak (Jav.).

Maten: Lengte tot aan den staart 330 cm; hoogte 15 cm [?]; lengte van de staart 50 cm; lengte van den kop 72 cm.

Verspr.: Java, Sumatra (?), Borneo (?). Volgens Trouessart niet op Sumatra of Borneo.

De kleur is donkergrijs. De jongen zijn lichter van kleur en een weinig behaard met vuil witte, geelachtige haren, die na een paar maanden verdwijnen.