


ПРИРОДА

ПОПУЛЯРНЫЙ ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ
Ж * У * Р * Н * А * Л
ИЗДАЕМЫЙ АКАДЕМИЕЙ НАУК СССР

№ 2

ФЕВРАЛЬ

1950




ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

ИСКОПАЕМЫЕ ОСТАТКИ НОСОРОГА В РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДА

Осенью 1941 г., при рытье пожарного водоёма на Суворовском пр. Ленинграда, были обнаружены ископаемые остатки шерстистого носорога (*Rhinoceros tichorhinus*). Кости носорога обнаружены на глубине, приблизительно, 1,5 м. Водоём был вырыт в садике около дома 26-а, недалеко от 9-й Советской ул. Из большого количества костей автору этой заметки удалось сохранить лишь череп носорога, фотография которого показана на фигуре (различные положения черепа).



Груда костей, принадлежащих носорогу, была помещена в одну из камер поблизости расположенного трансформаторного киоска, но за годы Великой Отечественной войны, при профилактических ремонтах, более мелкие кости, в том числе и нижняя челюсть носорога, были выброшены обслуживающим персоналом и оказались утраченными. Сохранилась только массивная кость — череп.

Эта находка должна представлять интерес с точки зрения заселения млекопитающими берегов Финского залива в дилuviальный (четвертичный) период. Считается, например, доказанным, что характерными млекопитающей последней ледниковой эпохи (вюрмской), наравне с мамонтами, являются и волосатые носороги, и с этой точки зрения казалось бы целесообразным отнести суше-

ствование носорогов в районе Ленинграда к этой эпохе или предшествующей межледниковой (Шельской). Но, по данным геологии, в ледниковые эпохи район Ленинграда был затоплен водами Иольднева моря, затем Анцелинового озера и потом сменившего его Литоринового моря. Поэтому могут быть высказаны предположения о более или менее длительной регрессии или регрессиях моря, или о заселении носорогами берегов Финского залива в более ранние эпохи, когда Балтийское море или находилось приблизительно в таких же границах, или эти границы были отодвинуты на запад.

И. Е. Балыгин.
