

HISTOIRE
NATURELLE

PAR BUFFON,

DÉDIÉE AU CITOYEN LACEPEDE,
MEMBRE DE L'INSTITUT NATIONAL.

QUADRUPÈDES.
TOME QUATORZIÈME.



A PARIS,

A LA LIBRAIRIE STÉRÉOTYPE
DE P. DIDOT L'AÎNÉ, GALERIES DU LOUVRE, N^o 3,
ET FIRMIN DIDOT, RUE DE THIONVILLE, N^o 116.

AN VII. — 1799.

PREMIÈRE DIVISION

TABLEAU

D E S

DIVISIONS, SOUS-DIVISIONS,

ORDRES ET GENRES

DES MAMMIFÈRES,

PAR LE C^{en} LACEPÈDE;

Avec l'indication de toutes les espèces
décrites par Buffon, et leur distribution
dans chacun des genres,

PAR F. M. DAUDIN.

PREMIÈRE DIVISION.

Point d'ailes membraneuses ni de nageoires.

QUADRUPÈDES PROPREMENT DITS.

PREMIÈRE SOUS-DIVISION.

Les quatre pieds en forme de mains.

QUADRUMANES.

Tome VII, page 5.

PREMIER ORDRE.

Dents incisives, laniaires et molaires.

PREMIER GENRE.

SINGE. (*Simia.*)

Quatre dents incisives à chaque mâchoire; angle facial de 65 degrés; point d'abajoues ni de queue.

ESPÈCES.

1. Le jocko, ou orang-outang de la petite espèce.
Simia satyrus. VII, 59; XII, 5.

TABLEAU DES MAMMIFÈRES. 145

2. Le grand gibbon. *Simia lar.* VII, 105.
3. Le petit gibbon. *Simia lar, varietas.* VII, 105.
4. Le jocko de Buffon (de son premier texte),
et le jeune pongo (de ses supplémens). *Simia troglodytes.* VII, 59; XII, 5.

SECOND GENRE.

GUENON. (*Cercopithecus.*)

Quatre dents incisives à chaque mâchoire;
angle facial de 60 degrés; abajoues;
queue; fesses calleuses.

ESPÈCES.

1. La guenon à long nez. *Cercopithecus nasica.*
XII, 79.
2. Le douc. *Cercopithecus Nemæus.* VII, 165;
XII, 123.
3. L'ouanderou. *Cercopithecus silenus.* VII, 124.
Le lowando. *Cercopithecus veter.* VII, 124;
XII, 74 et 77.
4. La guenon à face pourprée. XII, 116.
5. La guenon à crinière. XII, 118.
6. La guenon à camail. *Cercopithecus comosus.*
XII, 96.
7. Le mona, ou la mone. *Cercopithecus mona.*
VII, 151; XII, 109.
8. Le roloway ou la palatine, l'exquima, et le
Quadrupèdes. XIV. 13

DES MAMMIFÈRES. 175
QUARANTE-HUITIÈME GENRE.

PANGOLIN. (*Manis.*)

*Langue très-longue, déliée, extensible ;
corps couvert de grandes écailles.*

ESPÈCES.

1. Le pangolin. *Manis pentadactyla.* IV, 99.
 2. Le phatagin. *Manis tetradactyla.* IV, 99.
-

CINQUIÈME SOUS-DIVISION.

*Les doigts renfermés dans une peau très-
épaisse, ou plus de deux sabots.*

PACHYDERMES.

NEUVIÈME ORDRE.

Dents incisives, laniaires et molaires.

QUARANTE-NEUVIÈME GENRE.

COCHON. (*Sus.*)

*Dents incisives inférieures couchées en avant ;
museau en forme de butoir ; doigts inter-
médiaires de chaque pied touchant seuls la
terre.*

ESPÈCES.

1. Le cochon. *Sus porcus.* I, 242 ; XIII, 209.

 ONZIÈME ORDRE.

Dents molaires.

CINQUANTE-TROISIÈME GENRE.

RHINOCÉROS. (*Rhinoceros.*)

*Une ou deux grosses cornes sur le nez ;
de grands sabots à chaque pied.*

E S P È C E S.

1. Le rhinocéros. *Rhinoceros unicornis.* IV, 271.
 2. Le rhinocéros d'Afrique. *Rhinoceros bicornis.*
IX, 5, 10.
-

3. Le grand lamantin des Antilles. *Manatus australis*. IX, 246.
 4. Le grand lamantin de la mer des Indes. *Manatus Indicus*. IX, 250.
 5. Le petit lamantin d'Amérique. *Manatus minor*. IX, 251.
 6. Le petit lamantin du Sénégal. *Manatus Senegalensis*. IX, 254.
-

A D D I T I O N S.

Chat sauvage de la nouvelle Espagne. XIV, 13.

C'est le même que le serval. *Felis serval*.

Bizaam. *Mustela tigrina*. XIV, 44.

Le bizaam n'est pas un chat, comme Vosmaër l'a écrit, mais une espèce de marte, selon le témoignage de Linné.

Rat de Madagascar. XIV, 60.

Cet animal est un petit écureuil, différent de l'écureuil de Madagascar. *Sciurus Madagascariensis*.

Guerlinguets. XIV, 84.

Les guerlinguets sont des écureuils de la Guiane, nommés *rats de bois* par les colons.

QUARANTE-UNIÈME GENRE (*bis*).

A Y E - A Y E. (*Cheiromys.*)

Deux dents incisives supérieures et deux incisives inférieures très-comprimées.

E S P È C E.

1. Aye-aye de Madagascar. *Cheiromys Madagascariensis*. XIV, 92.
-

DEUXIÈME SOUS-DIVISION.

Point de pieds de derrière.

C É T A C É E S.

Nota. Nous donnerons le tableau des ordres, genres et espèces renfermés dans cette dernière sous-division qui termine la classe des MAMMIFÈRES, à la fin du volume de l'Histoire naturelle des cétacées, lequel paroîtra immédiatement après ceux des poissons.

T A B L E A U
D E S
SOUS-CLASSES, DIVISIONS,
SOUS-DIVISIONS, ORDRES
ET GENRES
D E S O I S E A U X,

PAR LE C^{on} LACEPÈDE;

**Avec l'indication de toutes les espèces
décrites par Buffon, et leur distribution
dans chacun des genres,**

P A R F. M. D A U D I N.