

ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI
INSTITUTUL DE ZOOLOGIE

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

MINISTERUL ECOLOGIEI, CONSTRUCȚIILOR ȘI DEZVOLTĂRII TERITORIULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA

**DIVERSITATEA,
VALORIFICAREA RAȚIONALĂ
ȘI PROTECȚIA LUMII ANIMALE**

Chișinău – 2001
CE USM

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ШЕРСТИСТОГО НОСОРОГА (*COELODONTA ATQUITATIS* BLUM., 1799) В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ В МОЛДОВЕ

Еремейко Наталья

Институт Зоологии АН Республики Молдова (Кишинэу)

Шерстистый носорог *S. antiquitatis* является одним из распространённых видов крупных плейстоценовых млекопитающих, который широко расселился во время среднего и позднего плейстоцена почти по всей территории Евразии. В Европе он отмечен, начиная с минделя, но получил широкое распространение лишь с рисского времени, особенно широко был распространён в позднем плейстоцене, в эпоху валдайского оледенения, являясь постоянным спутником мамонта и одним из характерных компонентов мамонтовой фауны (Громова, 1965; Верещагин, 1979; Алексеева, 1990). В позднем плейстоцене шерстистый носорог был объектом охоты первобытного человека, о чём свидетельствуют нахождения его костных остатков наряду с костями других крупных травоядных млекопитающих на стоянках палеолитических людей.

На территории Молдовы шерстистый носорог обитал со второй половины среднего и до конца позднего плейстоцена (Давид, 1966; 1980). По сравнению с другими млекопитающими, он был редким видом. Малочисленность костей носорога на палеолитических стоянках объясняется трудностями охоты на него и тем, что они были нестадными животными и держались парами или выводками (Верещагин, 1979). Его остатки в Молдове представлены главным образом отдельными зубами и фрагментами трубчатых костей. Наибольшее количество костей зарегистрировано на нижнепалеолитических стоянках в гротах Выхватинцы (132 кости от 10 особей) и Дуруитоарса Веке (75 костей от 10 особей) (Давид, 1966; 1980).

В первой половине позднего плейстоцена шерстистый носорог на территории Молдовы так же был редким видом. Так, на паласолитической стоянке Брынзець I обнаружены 28 костей от 6 особей, в мадленском слое стоянок Дуруитоареа Веке – 54 кости от 4 особей, Рашков VII – 97 костей от 4 особей и т. д. (Давид, 1980; 1990). Значительный интерес представляет целый череп, обнаруженный в с. Крикова. Самые поздние находки костей этого носорога на территории Молдовы по последним данным (Borziac, 1994) датируются мадленским временем (Рашков VII, Косэуць I) (примерно, 18-16 тыс. лет тому назад).

Обнаруженные на территории Молдовы костные остатки *S. antiquitatis* в строении и по размерам не отличаются от соответствующих остатков этого вида из других регионов Европы. Так, наибольшая длина пяточной кости (в мм) из Старых Дуруитор ($n=2$) – 128; 141; из Выхватинец ($n=1$) – 141; по работам В.И.Громовой (1960) – 110-145. Наибольшая длина пяточной кости (в мм) из Ст. Дуруитор ($n=2$) – 80; 88; из Выхватинец ($n=1$) – 95; по В.И.Громовой (1960) – 74-95. Наибольшая длина астрагала (в мм) из Ст. Дуруитор ($n=1$) – 88; из Брынзець ($n=2$) – 87; по В.И.Громовой (1960) – 70-90.

Судя по строению затылка и зубов, шерстистый носорог был обитателем холодных степей и лесостепей с древесно-кустарниковой растительностью тундрового типа и питался, главным образом, жёсткими травами и кустарниковой растительностью.