Borissiak Paleontological Institute
of the Russian Academy of Sciences

Department of Paleontology, Faculty of Geology
Lomonosov Moscow State University
Paleontological Society
Moscow Society of Naturalists

MODERN PALEONTOLOGY: CLASSICAL AND NEWEST METHODS

THE TWENTY-SECOND ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC SCHOOL FOR YOUNG SCIENTISTS IN PALEONTOLOGY

October 12–14, 2026
Borissiak Paleontological Institute
of the Russian Academy of Sciences, Moscow

PROGRAM
ABSTRACTS

Moscow 2026

Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка
Российской академии наук

Кафедра палеонтологии Геологического факультета
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
Палеонтологическое общество
Московское общество испытателей природы

СОВРЕМЕННАЯ ПАЛЕОНТОЛОГИЯ: КЛАССИЧЕСКИЕ И НОВЕЙШИЕ МЕТОДЫ

ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-ПАЛЕОНТОЛОГОВ

12–14 октября 2026 г.
Палеонтологический институт
им. А.А. Борисяка РАН, Москва

ПРОГРАММА
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Москва 2026

Руководитель научной школы, председатель Оргкомитета,
академик А.Ю. Розанов
Редакционная коллегия:
Д.В. Василенко, Н.Е. Завьялова, Н.В. Зеленков
Члены Оргкомитета:
академик С.В. Рожнов (зам. председателя)
проф., д.г.-м.н. А.С. Алексеев
д.б.н. Н.В. Зеленков
проф. РАН, д.б.н. П.Ю. Пархаев
к.б.н. Д.В. Василенко
к.б.н. Е.С. Казанцева (исполнительный секретарь)
к.б.н. А.А. Крутых (ответственный секретарь)
Г.С. Ткачева

© Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН

ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НОСОРОГА ИЗ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ТУЛЬЧИН (ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ, УКРАИНА)

И.А. Ермольчик[1], В.В. Титов[2]

[1]Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН
117647 Москва, Профсоюзная ул., 123
ivermolchick@gmail.com
[2]Южный научный центр РАН
344006 Ростов-на-Дону, пр-т Чехова, 41
vvtitov@yandex.ru

Местонахождение Тульчин (Тульчино) расположено вблизи города Тульчин на территории Украины (Винницкая область). Оно было открыто в 1871 году и известно находками костей крупных млекопитающих неогена (Pavlow, 1892). В коллекционных фондах ПИН РАН остатки из этого местонахождения представлены небольшим числом находок, сделанных Н.А. Соколовым в 1928 году в песках, относимых в литературе к балтской свите (Sinzow, 1873).

Изученный материал представлен хорошо сохранившимся фрагментом верхнечелюстной кости с левым зубным рядом P2–P4 (экз. ПИН, № 943/1). Зубы средней степени стертости. Они имеют субквадратную форму и очень широкий эктолоф. Парастиль и ребро паракона очень хорошо развиты, ребро метакона выражено слабо. Криста и кроше хорошо развиты. Они не сливаются между собой, оставляя среднюю ямку незамкнутой. Антекроше полностью отсутствует. Задняя ямка крупная. Цингулюм спереди очень мощный, хорошо развит у всех зубов. С лингвальной стороны цингулюм развит слабо. У второго премоляра при текущей степени стертости протокон и паракон изолированы друг от друга. У третьего премоляра лингвальнее кроше развита дополнительная складка, сопоставимая с кроше по размерам. Эмаль очень мощная, толщиной до 2 мм.

Морфологические признаки, демонстрируемые изученным экземпляром, позволяют уверенно отнести его к *Pliorhinus megarhinus* (de Christol, 1834). Большинство наблюдаемых дентальных признаков, а также морфометрические параметры, показывают сходство зубов носорога из местонахождения Тульчин с описанными в литературе остатками этого вида: в частности, характер и степень развития парастиля, ребер паракона и метакона, а также добавочных внутренних складок.

По современным представлениям интервал существования *Pliorhinus me*garhinus составляет 6.7–3.5 млн л.н. (Pandolfi et al., 2021). Присутствие этого носорога, а также состав сопутствующей фауны, позволяют предположительно датировать Тульчин биозонами MN 13–14 (поздний туролий или ранний русциний европейской шкалы LMA). Частично установленный к настоящему времени видовой состав млекопитающих из местонахождения (Дуброво, Капелист, 1979), по сравнению с одновозрастными местонахождениями этого же региона, характеризуется значительным присутствием лесостепных форм при сравнительно меньшем присутствии видов открытых пространств.